

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 17 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Difenoconazolo 250 g/l
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Realchemie Difenconazol	Numero di omologazione svizzero: D-4351 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 004353-00/022 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Difenconazol	Numero di omologazione svizzero: D-4352 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 004353-00/020 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Difenconazol	Numero di omologazione svizzero: D-4353 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 004353-00/019 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura:			
Vite	Marciume nero, Oidio della vite, Rossore parassitario	Concentrazione: 0.0125 % Applicazione: al più tardi entro metà agosto	1, 2, 3

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orticoltura:			
Aglione, Cipolle, Porro, Scalogni	Alternariosi (<i>Alternaria porri</i>), Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, Ruggini	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago, Ruggini	Dosaggio: 0.5–1 l/ha Applicazione: in estate	4
Barbabietola	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Carote	Alternariosi delle carote	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Culture coperte: Cetrioli	Cancro gommoso [Cancro gommoso (<i>Didymella bryoniae</i>)]	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 3 giorni	4
Erba cipollina	Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Applicazione: entro 1 settimana dal taglio	4
Indivia, Lattuga cappuccio [insalata in pieno campo]	Marciume della lattuga	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	4
Pomodori	Alternariosi delle Solanacee, Oidio, Septoriosi del pomodoro/della melanzana	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 3 giorni	4
Prezzemolo	<i>Alternaria</i> spp., Necrosi fogliare del prezzemolo	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: entro 1 settimana dal taglio	4
Sedano da condimento, Sedano da coste, Sedano rapa	Septoriosi del sedano	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Specie di cavoli	Maculature fogliari	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Valerianella	Oidio	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: prima o immediatamente dopo la piantagione, al più tardi allo stadio di 4 foglie	4
Campicoltura:			
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 0.5 l/ha	5
Colza	Marciume del colletto e dello stelo [Marciume da <i>Phoma</i> (<i>Phoma lingam</i>)]	Dosaggio: 0.5 l/ha	6
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 8
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 9
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 10

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

- 1 = Anche per applicazione per via aerea.
 - 2 = Al massimo 3 trattamenti per anno.
 - 3 = Contro il rossore parassitario, in combinazione con 0.1 % di Folpet.
 - 4 = Al massimo 4 trattamenti per anno.
 - 5 = Di regola solamente 1 trattamento a inizio infestazione.
 - 6 = Al massimo 1 trattamento su varietà sensibili in caso di attacco fogliare visibile tra la fase dell'accestimento e la formazione di 7 stoloni (BBCH 20–27).
 - 7 = Al massimo 1 trattamento tra lo stadio fenologico di 2 nodi e l'inizio della fioritura (BBCH 32–61).
 - 8 = Se oltre il 30 % delle foglie presenta sintomi d'infezione.
 - 9 = A inizio infestazione.
 - 10 = Su varietà poco sensibili, se oltre il 20 % delle 3 foglie pienamente sviluppate presenta sintomi d'infestazione (BBCH 37–61). Su varietà sensibili, dall'inizio dell'attacco.
-

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

17 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch