Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 30 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Tiacloprid 480 g/l
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Tiapid	Numero di omologazione svizzero: D-4602 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024587-00/028 Titolari stranieri di autorizzazioni: Menora GmbH
Realchemie Thiacloprid	Numero di omologazione svizzero: D-4540 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024714-00/008 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Thiacloprid	Numero di omologazione svizzero: D-4539 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024714-00/012 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Thiacloprid	Numero di omologazione svizzero: D-4541 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024714-00/014 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche:			
fragola	Afidi , autonomo delle fragole o dei lamponi	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 3, 4
lampone, mora	Afidi , autonomo delle fragole o dei lamponi, verme del lampone	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 3, 4
ribes	Cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 3
ribes, uva spina	Afidi	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 3
Frutticoltura:			
ciliegio	Efficacia parziale: mosca della ciliegia	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 5, 6
ciliegio	Autonomo del ciliegio	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Applicazione: dopo la fioritura (BBCH 69-72).	1, 5, 6
frutta a granelli	Carpocapsa delle mele Effetti secondari: piccola tortrice dei frutti	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: in estate.	1, 5, 6
frutta a granelli, frutta a nocciolo	Afidi Effetti secondari: falene	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 5, 6, 7
frutta a granelli, prugno	Tentredini	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Applicazione: alla fine della fioritura (BBCH 69-71).	1, 5, 6
melo	Autonomo del melo	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Applicazione: al germogliamento (BBCH 52-53).	1, 5, 6
prugno, prugnolo	Tortrice delle susine	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 5, 6
Campicoltura:			
colza	Meligete della colza, funteruolo delle silique delle crocifere	Dosaggio: 0.2 l/ha Applicazione: all'inizio dell'attacco.	1
patate	Dorifora della patata	Dosaggio: 0.1 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: trattamento a intervalli di 2 settimane.	8

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione piante ornam.:			
in generale	Oziorinchi	Applicazione: 6 ml per 100 l di substrato (procedura di immersione).	9
in generale	Afidi , cocciniglia virgola, cocciniglie cotonose, cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.02 %	1, 2
in generale	Aleurodi	Concentrazione: 0.03 %	1, 2

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 2 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 3 = Dose indicata: per fragole dallo stadio di piena fioritura a inizio arrossamento dei frutticini, 4 piante per m², per more e lamponi estivi dallo stadio di inizio fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m³/ha, per lamponi autunnali dallo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m³/ha, per ribes e uva spina dallo stadio di allegagione al 50–90 %, volume delle siepi 7500 m³/ha.
- 4 = Applicazione poco prima della fioritura. Ripetere l'applicazione in caso di volo abituale dell'Antonomo.
- 5 = La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.
- 6 = SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 20 m rispetto alle acque di superficie. Questa distanza può venire ridotta adottando le misure tecniche di riduzione della deriva riportate nelle Istruzioni dell'UFAG.
- 7 = Effetto secondario sulle falene: solo se applicato direttamente prima o dopo la fioritura (BBCH 58-69).
- 8 = Al massimo 3 trattamenti per anno.
- 9 = Diluire 6 ml in 10 l di acqua e in seguito annaffiare (la poltiglia è sufficiente per 100 l di substrato).

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

30 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch