

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 2 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Azossistrobina 250 g/l
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Ortiva	Numero di omologazione svizzero: D-4616 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004560-00/010 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
Amistar	Numero di omologazione svizzero: D-4617 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-005090-00/022 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
Amistar	Numero di omologazione svizzero: D-4618 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-005090-00/023 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
EURO STAR II	Numero di omologazione svizzero: D-4702 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-005090-00/005 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH
EURO STAR II	Numero di omologazione svizzero: D-4703 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-005090-00/016 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

¹ RS 916.161

Realchemie Azoxystrobin-I	Numero di omologazione svizzero: D-4741 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 004560-00/009 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Azoxystrobin	Numero di omologazione svizzero: D-4747 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 005090-00/006 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche:			
Fragola	Oidio della fragola Efficacia parziale: Marciume grigio (<i>Botrytis cinerea</i>)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 2, 3
Josta, Ribes nero, Ribes rosso, Uva spina	Oidio delle varietà di ribes	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 4
Lampone, Mora	Efficacia parziale: Didimella della mora di rovo, Didimella del lampone	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha	1, 2, 5
Ribes nero, Ribes rosso, Uva spina	Antracnosi	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 4
Frutticoltura:			
Albicocco, Pesco/pesco noce, Prugno, Prugnolo	Monilia spp., Vaiolatura della frutta a nocciolo (<i>Stigmina carpophila</i>)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 6
Ciliegio	Antracnosi del ciliegio, Monilia spp., Vaiolatura della frutta a nocciolo (<i>Stigmina carpophila</i>)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 6
Orticoltura:			
Aglio, Cipolle, Scalogni	Peronospora della cipolla	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 7
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago, Ruggine dell'asparago	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1–1.5 l/ha	1, 7
Carote	Altenariosi delle carote	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 7
Colture coperte: Cetrioli, Meloni, Zucchine	Oidio delle Cucurbitacee, Peronospora delle Cucurbitacee	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 giorni	1, 7
Colture coperte: Pomodori	Altenariosi delle Solanacee, Oidio del pomodoro, Peronospora del pomodoro	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 giorni	1, 7
Erba cipollina	Alternaria spp. [Alternariosi (<i>Alternaria porri</i>)]	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 7

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Fagiolo nano	Antracnosi del fagiolo, Botrytis fabae, Mal dello sclerozio, Peronospora del fagiolo	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1
Finocchio	Cercosporiosi e ramulariosi, Peronospora delle ombrellifere	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 1 settimana	1, 7
Lattuga cappuccio	Peronospora della lattuga, Rizotonia della lattuga Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 7
Porro	Alternariosi (Alternaria porri) [Alternariosi (Alternaria porri)], Mal del colletto [Peronospora del porro (Phytophthora porri)]	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 7
Prezzemolo	Necrosi fogliare del prezzemolo	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: al più tardi 3 settimane dopo il taglio.	1, 7
Sedano	Septoriosi del sedano	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 7
Campicoltura:			
Colza	Mal dello sclerozio della colza	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 61–65 (BBCH).	8
Frumento	Oidio del grano	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 30–61 (BBCH).	8
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 32–61 (BBCH).	8
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH).	8
Frumento	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 37–51 (BBCH).	8
Frumento	Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 51–61 (BBCH).	8
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH).	8, 9
Frumento	Oidio del grano	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadio 30–37 (BBCH).	8, 9
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31–61 (BBCH).	8, 9
Frumento	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–51 (BBCH).	8, 9
Frumento	Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum)	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 51–61 (BBCH).	8, 9

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Luppolo	Peronospora del luppolo Efficacia parziale: Oidio del luppolo	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 4 settimane	10, 11, 12
Orzo	Macchie reticolate (elmintosporiosi) dell'orzo, Oidio dell'orzo, Rincosporiosi, Ruggine bruna/nana dell'orzo	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 31–51 (BBCH).	8
Orzo	Macchie reticolate (elmintosporiosi) dell'orzo, Oidio dell'orzo, Rincosporiosi	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31–51 (BBCH).	8, 9
Patate	Alternariosi delle Solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 13, 14
Piselli per conserve, Piselli proteici	Elmintosporiosi, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Peronospora del pisello	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	15
Segale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH).	8
Triticale	Rincosporiosi	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 37–51 (BBCH).	8

Coltivazione piante ornam.:

Cardo azzurro	Peronospora del cardo azzurro	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha	1
Crisantemo, Garofani, Liliacee, Rose	Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha	10
Tappeti erbosi e terreni sportivi [anche campi da golf]	Colletotrichum graminola, Elmintosporiosi, Filo rosso del tappeto erboso, Macchie estive, Mal del piede (Fusarium culmorum), Mal del piede dei cereali, Mal del piede dei cereali var. avena (tappeto erboso), Ophiostoma herpotricha, Pythium spp., Rizotom	Dosaggio: 1 l/ha	10

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 2 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 3 = La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini, 4 piante/m².
- 4 = La dose indicata si riferisce allo stadio di allegagione al 50–90 %, volume delle siepi 7500 m³/ha.
- 5 = Per i lamponi estivi e le more la dose per trattamento indicata si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m³/ha. Per i lamponi autunnali la dose per trattamento si riferisce allo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m³/ha.
- 6 = La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.
- 7 = In orticoltura questo prodotto può provocare danni ai vegetali in colture non autorizzate. Evitare la deriva del prodotto.

-
- 8 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
 - 9 = In combinazione con Pronto Plus (0.8 l/ha).
 - 10 = Al massimo 4 trattamenti per anno e particella.
 - 11 = Attenzione: rischio di resistenza! Impiegare Amistar in alternanza con prodotti di altri gruppi di principi attivi.
 - 12 = La dose massima di 1.6 l/ha per applicazione non deve essere superata.
 - 13 = Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.
 - 14 = Trattamento durante la crescita completa dell'erba. Intervalli fra le irrorazioni: 7–10 giorni.
 - 15 = Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di 8–12 giorni.
-

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

2 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch