

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 30 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Glufosinate 200 g/l
Tipo di formulazione: SL concentrato solubile in acqua

2. Prodotti commerciali

Realchemie Glufosinat Numero di omologazione svizzero: D-4751
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: PI 043570-00/005
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche:			
fragola	Rizomi di fragola	Dosaggio: 4 l/ha	1
lampone	Lotta contro i ricacci	Dosaggio: 5 l/ha	
lampone, mirtillo, mora, ribes, uva spina	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha	
Frutticoltura:			
in generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha	

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura:			
in generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha	
in generale [ricacci]	Disseccamento, essiccamento	Concentrazione: 1–1.5 % Applicazione: periodo di vegetazione.	
Orticultura:			
asparagi	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: dopo il raccolto.	2, 3, 4
carciofi, cardo	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: dopo la levata delle malerbe.	2, 3, 4, 5
cicoria belga	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: dopo la levata delle malerbe.	2, 3, 4
cucurbitacee	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: dopo la levata delle malerbe.	2, 3, 4, 5
fagiolo rampicante	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: dopo la levata delle malerbe.	2, 3, 4, 5
in generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–5 l/ha Applicazione: tra semina e levata.	
melanzana, paprica, peperone dolce, pomodori	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: dopo la levata delle malerbe.	2, 3, 4, 5

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
rabarbaro	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: dopo il raccolto.	2, 3, 4
Campicoltura:			
luppolo	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3-5 l/ha	6
maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3-5 l/ha	
patate	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 2 - 3 l/ha Applicazione: in prelevata.	
patate da foraggio, patate da tavola	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 3-5 l/ha	
Coltivazione piante ornam.:			
in generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4-5 l/ha	
Selvicoltura:			
vivai forestali	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Efficacia parziale: dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4-5 l/ha	

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Prima del trattamento: estirpazione meccanica degli stoloni.
- 2 = La dose si riferisce alla superficie effettiva da trattare.
- 3 = Il trattamento erbicida non deve interessare la coltura. Richiesta una schermatura.
- 4 = Trattamento solo della superficie tra le file.
- 5 = Nessun trattamento a partire da inizio fioritura.
- 6 = Non applicare per la pulizia del luppolo.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

30 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch