

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Glifosato 362.7 g/l

Tipo di formulazione: SL concentrato solubile in acqua

2. Prodotti commerciali

Stream SL Numero di omologazione svizzero: I-2727
Paese di origine: Italia
Numero di omologazione straniero: 8429
Titolari stranieri di autorizzazioni: Cheminova Agro Italia S.R.L.

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli, frutta a nocciolo, more	Dicotiledoni annuali (malerbe), gramigna, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2–3 l/ha	1, 2, 3, 4
Frutta a granelli, frutta a nocciolo, more	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–10 l/ha	1, 2, 3, 4

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura			
Vite in produzione	Dicotiledoni annuali (malerbe), gramigna, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha	1, 2, 3, 4
Vite in produzione	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4-10 l/ha	1, 2, 3, 4
Orticoltura			
Maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), gramigna, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha	1, 2, 3, 5
Maggese	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4-10 l/ha	1, 2, 3, 5
Campicoltura			
Maggese, semine a lattiera, semine dopo la fresatura	Dicotiledoni annuali (malerbe), gramigna, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha	1, 2, 3, 5
Maggese, semine a lattiera, semine dopo la fresatura	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4-10 l/ha	1, 2, 3, 5
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), monocotiledoni (malerbe)	Concentrazione: 5-10 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: lotta pianta per pianta mediante vaporizzatore e barra a corda umettante.	1, 2, 3, 5, 6
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), monocotiledoni (malerbe)	Concentrazione: 0.5-1.5 % Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 3, 5, 6
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 4-10 l/ha Applicazione: trattamento su tutta la superficie prima della risemina.	1, 2, 3, 5
Coltivazione piante ornam.			
Arbusti, Boschetti (al di fuori del bosco)	Dicotiledoni annuali (malerbe), gramigna, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha	1, 2, 3, 4
Arbusti, Boschetti (al di fuori del bosco)	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4-10 l/ha	1, 2, 3, 4
Piante [annuale e biennale]	Dicotiledoni annuali (malerbe), gramigna, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha	1, 2, 3, 5
Piante [annuale e biennale]	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4-10 l/ha	1, 2, 3, 5

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Selvicoltura			
Vivai forestali	Dicotiledoni annuali (malerbe), gramigna, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha	1, 2, 3, 4
Vivai forestali	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4-10 l/ha	1, 2, 3, 4

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = L'utente deve essere accuratamente informato sui rischi di danni. Occorre indicare le possibilità di prevenzione.
2 = Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento.
3 = Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe.
4 = Applicazione al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera).
5 = Applicazione al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione.
6 = Termine di attesa di 2 settimane per il foraggiamento di bovini o di animali in asciutta.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch