

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Tebuconazolo 250 g/l

Tipo di formulazione: EW emulsione, olio in acqua

2. Prodotti commerciali

Folicur	Numero di omologazione svizzero: D-2491 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 4028-00 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience AG
Corail	Numero di omologazione svizzero: F-2628 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 9300257 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience SA
Horizon EW	Numero di omologazione svizzero: F-2629 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 9200078 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience SA
Maronee	Numero di omologazione svizzero: F-2630 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2000420 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience SA
Tabou	Numero di omologazione svizzero: F-2631 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2010482 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience SA

¹ RS 916.161

Triade
 Numero di omologazione svizzero: F-2632
 Paese di origine: Francia
 Numero di omologazione straniero: 9500054
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience SA

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Ciliegio	Muffa dei fruttiferi	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.48 l/ha Applicazione: dalla fioritura alla scamicatura.	1, 2, 3
Orticoltura			
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago, ruggine dell'asparago	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: giovani piantagioni e piantagioni in produzione (dopo il taglio).	3, 4
Carote	Altenariosi delle carote, oidio	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: all'inizio dell'attacco.	5
Fagioli	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: inizio fioritura e piena fioritura.	4, 6, 7
Specie di cavoli	Maculatura anulare nera del cavolo, oidio	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: all'inizio dell'attacco.	8
Campicoltura			
Colza	Marciume del colletto e dello stelo	Dosaggio: 1-1.5 l/ha Applicazione: stadi 20-27 (BBCH), Stadi 30-31 (BBCH).	9
Colza	Mal dello sclerozio della colza	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 61-65 (BBCH).	9
Frumento	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 55-69 (BBCH).	9, 10
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.5-1 l/ha Applicazione: stadi 32-61 (BBCH).	9, 11
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.5-1 l/ha Applicazione: stadi 37-61 (BBCH).	9, 12
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 32-61 (BBCH).	9

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frumento	Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 51–61 (BBCH).	9
Lino	Discosphaerina fulvida, Mycosphaerella linicola, Oidium lini	Dosaggio: 1 l/ha	4
Segale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH).	9

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = La dose si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.
- 2 = Al massimo 3 trattamenti per particella e anno.
- 3 = SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 20 m rispetto alle acque di superficie. Questa distanza può venire ridotta adottando le misure tecniche di riduzione della deriva riportate nelle Istruzioni dell'UFAG.
- 4 = Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 5 = Max. 3 trattamenti a intervalli di 14–21 giorni.
- 6 = In combinazione con 2 l/ha di Scala.
- 7 = Solo in caso di forte attacco.
- 8 = Max. 3 trattamenti a intervalli di 21–28 giorni.
- 9 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 10 = Su varietà sensibili dopo una semina senza lavorazione del suolo (dopo frumento o mais).
- 11 = Dose elevata per varietà fortemente sensibili o alla comparsa di focolai che danno origine all'infestazione.
- 12 = Dose elevata soltanto per varietà fortemente sensibili.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch