

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Pyrimethanil 400 g/l

Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Scala jardin Numero di omologazione svizzero: F-2633

Paese di origine: Francia

Numero di omologazione straniero: 2010512

Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience SA

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragole, lamponi, more	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.3 % Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Marciume (Botrytis cinerea), muffa dei fruttiferi, ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: durante la fioritura.	2, 3, 4
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: dallo stadio BBCH 56 (bottoni fiorali visibili) fino a sfioritura.	2, 3, 4

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura			
Vite	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.2–0.25 % Dosaggio: 2.4–3 l/ha	1, 5
Orticoltura			
Aglio, Cipolle, Scalogni	Botrytis spp.	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1
Colture coperte: cetrioli, melanzana, peperone dolce, pomodori	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.125 % Termine d'attesa: 3 giorni	1
Fagioli	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: inizio fioritura e piena fioritura.	6, 7, 8
Fagioli	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Applicazione: 2 trattamenti sul fiore aperto e che sta sbocciando.	
Insalate (Asteracee)	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 2 l/ha	1, 9
Coltivazione piante ornam.			
In generale	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 2 l/ha	1

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 2 = La dose si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.
- 3 = Al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 4 = Soltanto in combinazione con Captan 80 WDG (0.1 %, 1.6 kg/ha) o Delan WG (0.03 %, 480 g/ha).
- 5 = Ultimo trattamento: a inizio invaiatura o a inizio viraggio del colore, ma al più tardi a metà agosto.
- 6 = Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 7 = In combinazione con 1.0 l/ha di Horizont 250 EW.
- 8 = Solo in caso di forte attacco.
- 9 = Per l'allevamento di piante giovani e piantine, ultima applicazione al più tardi 14 giorni dopo la piantagione nell'ubicazione definitiva.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch