

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 27 novembre 2007

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Ciclossidim 100 g/l

Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Focus Ultra	Numero di omologazione svizzero: A-4114 Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2509-0 Titolari stranieri di autorizzazioni : BASF AG
Focus Ultra	Numero di omologazione svizzero: D-4115 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 3964-00 Titolari stranieri di autorizzazioni : BASF AG
Ciclosim	Numero di omologazione svizzero: I-4116 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 13654 Titolari stranieri di autorizzazioni : SIMAR SRL
Stratos Ultra	Numero di omologazione svizzero: I-4117 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 10117 Titolari stranieri di autorizzazioni : BASF Italia SpA

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragole	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane Applicazione: prima della fioritura e dopo il raccolto.	
Fragole	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane Applicazione: prima della fioritura e dopo il raccolto.	1
Fragole	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane Applicazione: prima della fioritura e dopo il raccolto.	
Frutticoltura			
Frutta a granelli, frutta a nocciolo	Monocotiledoni annuali (malerbe) [salvo Poa annua]	Dosaggio: 1–2 l/ha Applicazione: primavera, estate.	
Frutta a granelli, frutta a nocciolo	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Applicazione: primavera, estate.	1
Frutta a granelli, frutta a nocciolo	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Applicazione: primavera, estate.	
Viticultura			
In generale	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Applicazione: primavera, estate.	
In generale	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Applicazione: primavera, estate.	1
In generale	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Applicazione: primavera, estate.	
Orticoltura			
Aglio, barbabietola, cipolle, pomodori, porro, scalogni, sedano rapa	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	
Aglio, barbabietola, cipolle, pomodori, porro, scalogni, sedano rapa	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1
Aglio, barbabietola, cipolle, pomodori, porro, scalogni, sedano rapa	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	
Carote, fagiolo nano, finocchio selvatico, specie di cavoli	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Carote, fagiolo nano, finocchio selvatico, specie di cavoli	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1
Carote, fagiolo nano, finocchio selvatico, specie di cavoli	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	
Erba cipollina	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Applicazione: soltanto nell'anno di coltivazione.	
Erba cipollina	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Applicazione: soltanto nell'anno di coltivazione.	1
Erba cipollina	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Applicazione: soltanto nell'anno di coltivazione.	1
Rabarbaro	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Applicazione: dopo il raccolto.	
Rabarbaro	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Applicazione: dopo il raccolto.	1
Rabarbaro	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Applicazione: dopo il raccolto.	
Campicoltura:			
Barbabietola da foraggio, barbabietola da zucchero, girasole, patate, soia, tabacco	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	
Barbabietola da foraggio, barbabietola da zucchero, girasole, patate, soia, tabacco	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1
Barbabietola da foraggio, barbabietola da zucchero, girasole, patate, soia, tabacco	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	
Colza	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Termine d'attesa: 12 settimane	
Colza	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Termine d'attesa: 12 Settimane	1
Colza	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Termine d'attesa: 12 settimane	
Fava	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	
Fava	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha	
Kenaf	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2–4 l/ha Applicazione: in postlevata.	
Kenaf	Ricacci di cereali	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: in postlevata.	
Mais [tollerante al Ciclossidim]	Monocotiledoni annuali (malerbe), ricacci di cereali, Tipi di miglio	Dosaggio: 2–3 l/ha Applicazione: in postlevata.	

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Mais [tollerante al Ciclossidim]	Gramigno, monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: in postlevata.	
Piselli	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	
Piselli	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1
Piselli	Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5–3 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	
Coltivazione piante ornam.			
In generale	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha	2
In generale	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha	1, 2
Selvicoltura			
Vivai forestali	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–2 l/ha	2
Vivai forestali	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4–6 l/ha	1, 2

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = L'utente deve essere informato del fatto che l'efficacia contro le malerbe pluriennali, in particolare la gramigna, di regola non si estende oltre la durata della coltura trattata.
2 = Indicare le colture e la loro tollerabilità.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere

allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

27 novembre 2007

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch