Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 27 novembre 2007

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Diquat 200 g/l

Tipo di formulazione: SL concentrato solubile in acqua

2. Prodotti commerciali

Reglone
Numero di omologazione svizzero: D-4222
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: 0287-00
Titolari stranieri di autorizzazioni: Syngenta Agro GmbH

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche			
Bacche	Dicotiledoni (malerbe)	Concentrazione: 0.4 % Applicazione: in 300–1200 l di acqua/ha; dal primo anno.	1
Frutticoltura			
Frutta a granelli, frutta a nocciolo	Dicotiledoni (malerbe)	Concentrazione: 0.4 % Applicazione: in 300–1200 l di acqua/ha; dal primo anno.	1
Viticultura			
In generale	Cardi biennali, dicotiledoni annuali (malerbe), vilucchio bianco, vilucchio comune	Concentrazione: 0.4 % Applicazione: in 300–1200 l di acqua/ha; dal primo anno.	1

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orticoltura			
Carote, cipolle, porro, Dicotiledoni (malerbe) valerianella		Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: prima della levata delle colture.	1
Campicoltura			
Patate da foraggio, patate da tavola	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 4.5 l/ha Applicazione: inizio del periodo della distruzione del frascame delle patate.	
Patate da foraggio, patate da tavola	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 3.6–4.8 l/ha Applicazione: periodo principale della distruzione del frascame.	
Patate da foraggio [precoce], patate da tavola [precoce]	Dicotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: alla levata delle malerbe.	
Prati e pascoli	Veronica filiforme	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: autunno inoltrato, poco dopo l'ultimo pascolo o l'ultimo taglio.	
Coltivazione piante ornam.			
Boschetti (al di fuori del bosco)	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4–5 l/ha Applicazione: in 300–1200 l di acqua/ha.	1, 2

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Rendere attenti sulla potenziale ricrescita di monocotiledoni e dicotiledoni pluriennali.
2 = Indicare le colture e la loro tollerabilità.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

27 novembre 2007

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch