Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation

du 26 octobre 2010

L'Office fédéral de l'agriculture,

vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires¹, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies,

décide:

Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:

1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés)

Substance(s) active(s): propaquizafop 100 g/l
Formulation: EC concentré émulsifiable

2. Produits commerciaux

Realchemie Propaquizafop Numéro d'homologation suisse: D-4757
Pays d'origine: Allemagne
numéro d'homologation étranger: PI 024107-00/016
titulaire de l'autorisation étranger: Realchemie BV

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible/effets	Application	(*)
Arboriculture:			
espèces de Ribes, framboise, fruits à noyaux, fruits à pépins, ronces	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha	
espèces de Ribes, framboise, fruits à noyaux, fruits à pépins, ronces	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha	1
espèces de Ribes, framboise, fruits à noyaux, fruits à pépins, ronces	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Application: stade 2–3 feuilles.	

¹ RS 916.161

Domaine d'application	Organisme nuisible/effets	Application	(*)
fraise	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Application: avant la floraison et après la récolte.	
fraise	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Application: avant la floraison et après la récolte.	1
fraise	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Application: avant la floraison et après la récolte uniquement; stade 2–3 feuilles.	
Culture maraîchère:			
ail, betterave à salade, céleri, choux, échalote, oignon, poireau, tomate	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 8 Semaine(s)	
ail, betterave à salade, céleri, choux, échalote, oignon, poireau, tomate	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Délai d'attente: 8 Semaine(s)	1
ail, betterave à salade, céleri, choux, échalote, oignon, poireau, tomate	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Délai d'attente: 8 Semaine(s) Application: stade 2–3 feuilles.	
asperge, rhubarbe	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Application: après la récolte.	
asperge, rhubarbe	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Application: après la récolte.	1
asperge, rhubarbe	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Application: après la récolte, stade 2–3 feuilles.	
carotte	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 4 Semaine(s)	
carotte	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Délai d'attente: 4 Semaine(s)	1
carotte	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Délai d'attente: 4 Semaine(s) Application: stade 2–3 feuilles.	
chicorée witloof (chicorée-endive), scorsonère	monocotylédones annuelles	Dosage: 1 l/ha Délai d'attente: 8 Semaine(s)	
épinard	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	
épinard	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	1
épinard	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s) Application: stade 2–3 feuilles.	
fenouil bulbeux, haricot nain	monocotylédones annuelles	Dosage: 1 l/ha Délai d'attente: 4 Semaine(s)	
persil	monocotylédones annuelles	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s) Application: post-levée.	

Domaine d'application	Organisme nuisible/effets	Application	(*)
Grande culture:			
betterave fourragère, betterave sucrière, féverole, soja	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 8 Semaine(s)	
betterave fourragère, betterave sucrière, féverole, soja	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Délai d'attente: 8 Semaine(s)	1
betterave fourragère, betterave sucrière, féverole, soja	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Délai d'attente: 8 Semaine(s) Application: stade 2–3 feuilles.	
colza	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 12 Semaine(s)	
colza	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Délai d'attente: 12 Semaine(s)	1
colza	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Délai d'attente: 12 Semaine(s) Application: stade 2–3 feuilles.	
pois de conserve	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 4 Semaine(s)	
pois de conserve	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Délai d'attente: 4 Semaine(s)	1
pois de conserve	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Délai d'attente: 4 Semaine(s) Application: stade 2–3 feuilles.	
pois protéagineux, pomme de terre	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 6 Semaine(s)	
pois protéagineux, pomme de terre	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Délai d'attente: 6 Semaine(s)	1
pois protéagineux, pomme de terre	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Délai d'attente: 6 Semaine(s) Application: stade 2–3 feuilles.	
pomme de terre de consommation [pommes de terre précoces]	monocotylédones annuelles, repousses de céréales	Dosage: 0.75–1.25 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	
pomme de terre de consommation [pommes de terre précoces]	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	1
pomme de terre de consommation [pommes de terre précoces]	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s) Application: stade 2–3 feuilles.	
Culture ornementale:			
toutes les cultures	monocotylédones annuelles	Dosage: 0.75–1.25 l/ha	2
toutes les cultures	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha	1, 2
toutes les cultures	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Application: stade 2–3 feuilles.	2

Domaine d'application	Organisme nuisible/effets	Application	(*)
Sylviculture: pépinières forestières	monocotylédones annuelles	Dosage: 0.75–1.25 l/ha	
pépinières forestières	chiendent rampant	Dosage: 1.5–2.5 l/ha	1
pépinières forestières	pâturin annuel	Dosage: 2.5 l/ha Application: stade 2–3 feuilles.	

(*) Charges et remarques

- 1 = Il est possible de fractionner le traitement (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée).
2 = Indication des cultures et de leur résistance au traitement.

Stockage et élimination

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle

La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Voies de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Celui-ci doit être adressé au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

26 octobre 2010

Office fédéral de l'agriculture:
Le directeur, Manfred Bötsch