

# Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation

du 16 décembre 2005

---

*L'Office fédéral de l'agriculture,*

vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires<sup>1</sup>, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies,

*décide:*

**Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:**

*1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés)*

Substance(s) active(s): Schwefel 80,0 %

Formulation: WP

*2. Produits commerciaux*

Colpenn                      Numéro d'homologation suisse: F-3723  
                                    pays d'origine: France  
                                    numéro d'homologation étranger: 9400501  
                                    distributeur: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière,  
                                    78370 Plaisir

Gammasoufre              Numéro d'homologation suisse: F-3724  
                                    pays d'origine: France  
                                    numéro d'homologation étranger: 9300055  
                                    distributeur: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière,  
                                    78370 Plaisir

Necator GD                Numéro d'homologation suisse: F-3725  
                                    pays d'origine: France  
                                    numéro d'homologation étranger: 9700114  
                                    distributeur: CALLIOPE S.A., Route d'Artix,  
                                    BP 80,64150 Noguères

Oidiase WP                Numéro d'homologation suisse: F-3726  
                                    pays d'origine: France  
                                    numéro d'homologation étranger: 9300392  
                                    distributeur: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière,  
                                    78370 Plaisir

<sup>1</sup> RS 916.161

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penn's     | Numéro d'homologation suisse: F-3727<br>pays d'origine: France<br>numéro d'homologation étranger: 9200417<br>distributeur: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière,<br>78370 Plaisir |
| Pennsoufre | Numéro d'homologation suisse: F-3728<br>pays d'origine: France<br>numéro d'homologation étranger: 9000452<br>distributeur: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière,<br>78370 Plaisir |

### Applications autorisées:

| Domaine d'application    | Maladie/effets                                                                                                                   | Mode d'application                                                                             | (*) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Culture des baies</b> |                                                                                                                                  |                                                                                                |     |
| fraise                   | oïdium du fraisier                                                                                                               | concentration: 0.2–0.4 %                                                                       | 1   |
| ronces                   | ériophyide des ronces                                                                                                            | concentration: 2 %<br>application: pulvérisation<br>au débourrement                            |     |
| ronces                   | ériophyide des ronces                                                                                                            | concentration: 1 %<br>application: après le<br>débourrement (longueur<br>des pousses 10–15 cm) | 2   |
| <b>Arboriculture</b>     |                                                                                                                                  |                                                                                                |     |
| fruits à noyaux          | maladie criblée des Prunus<br>effet secondaire: ériophyides libres                                                               | concentration: 0.75 %<br>application: avant la<br>floraison                                    | 3   |
| fruits à noyaux          | maladie criblée des Prunus<br>effet secondaire: ériophyides libres                                                               | concentration: 0.3–0.5 %<br>délai d'attente: 3 semaines<br>application: après la<br>floraison  | 3   |
| fruits à pépins          | oïdium du pommier/du poirier<br>effet partiel: tavelure des arbres<br>fruitiers à pépins<br>effet secondaire: ériophyides libres | concentration: 0.75 %<br>application: au débourre-<br>ment                                     |     |
| fruits à pépins          | oïdium du pommier/du poirier<br>effet partiel: tavelure des arbres<br>fruitiers à pépins<br>effet secondaire: ériophyides libres | concentration: 0.5–0.75 %<br>application: avant la<br>floraison                                | 4   |
| fruits à pépins          | oïdium du pommier/du poirier<br>effet partiel: tavelure des arbres<br>fruitiers à pépins<br>effet secondaire: ériophyides libres | concentration: 0.3–0.5 %<br>application: après la<br>floraison                                 |     |
| pêcher / nectarine       | oïdium du pêcher, tavelure noire du<br>pêcher                                                                                    | concentration: 0.3–0.5 %<br>délai d'attente: 3 semaines<br>application: après la<br>floraison  |     |
| <b>Viticulture</b>       |                                                                                                                                  |                                                                                                |     |
| toutes les cultures      | acarirose de la vigne, érinose de la<br>vigne                                                                                    | concentration: 2 %<br>application: pulvérisation<br>au débourrement                            |     |

| Domaine d'application      | Maladie/effets             | Mode d'application                                                                                      | (*) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| toutes les cultures        | oïdium de la vigne         | concentration: 0.1–0.2 %<br>délai d'attente: 3 semaines<br>application: jusqu'à<br>mi-août au plus tard | 5   |
| toutes les cultures        | oïdium de la vigne         | concentration: 0.3–0.4 %<br>délai d'attente: 3 semaines<br>application: jusqu'à<br>mi-août au plus tard | 5,6 |
| <b>Culture maraîchère</b>  |                            |                                                                                                         |     |
| cucurbitacées              | oïdium des cucurbitacées   | concentration: 0.1–0.2 %<br>délai d'attente: 3 jours                                                    |     |
| tomate                     | oïdium de la tomate        | concentration: 0.1–0.2 %<br>délai d'attente: 3 jours                                                    |     |
| <b>Grande culture</b>      |                            |                                                                                                         |     |
| houblon                    | oïdium du houblon          | concentration: 0.25 %<br>délai d'attente: 1 semaine<br>application: préventif dès<br>1 m de hauteur     | 7   |
| <b>Culture ornementale</b> |                            |                                                                                                         |     |
| laurier-cerise             | maladie criblée des Prunus | concentration: 0.1–0.2 %<br>dosage: 1–2 g/l d'eau                                                       |     |
| toutes les cultures        | oïdium                     | concentration: 0.1–0.2 %<br>dosage: 1–2 g/l d'eau                                                       |     |

**(\*) Restrictions et remarques:**

- 1 = Pas d'utilisation entre la floraison et la récolte.
- 2 = Traiter une deuxième fois en cas de forte attaque.
- 3 = Les abricots ne supportent pas bien le soufre, ne pas traiter.
- 4 = Traitements post-floraux uniquement sur les variétés supportant le soufre.
- 5 = Convient également au traitement par voie aérienne.
- 6 = Dans des expositions à attaque forte.
- 7 = 15 traitements au maximum à 7 jours d'intervalle environ.

**Stockage et élimination**

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

## **Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle**

La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

### **Voies de droit**

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission de recours en matière de produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son représentant; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

16 décembre 2005

Office fédéral de l'agriculture:

Le directeur, Manfred Bötsch