

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 3 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Ciprodinil 37.5 %
 Fludioxonil 25 %

Tipo di formulazione: WG granulare idrodispersibile

2. Prodotti commerciali

Realchemie	Numero di omologazione svizzero: D-4339
Cyprodinil &	Paese di origine: Germania
Fludioxonil	Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/003
	Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie	Numero di omologazione svizzero: D-4340
Cyprodinil &	Paese di origine: Germania
Fludioxonil	Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/009
	Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie	Numero di omologazione svizzero: D-4341
Cyprodinil &	Paese di origine: Germania
Fludioxonil	Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/006
	Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie	Numero di omologazione svizzero: D-4342
Cyprodinil &	Paese di origine: Germania
Fludioxonil	Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/002
	Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie	Numero di omologazione svizzero: D-4343
Cyprodinil &	Paese di origine: Germania
Fludioxonil	Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/012
	Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

¹ **RS 916.161**

Realchemie	Numero di omologazione svizzero: D-4344
Cyprodinil &	Paese di origine: Germania
Fludioxonil	Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/004
	Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche:			
Fragole	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1–1.2 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 2
Lamponi, more	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1–1.2 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 3, 4
Ribes nero, ribes rosso	Antracnosi	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 7 giorni	5, 6
Frutticoltura:			
Albicocco, pesco/nettarine, prugno	Muffa delle piante da frutto	Concentrazione: 0.06 % Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dallo stadio 71–72 e 77–79	7, 8
Frutta a nocciolo [salvo ciliegi/ciliegie]	Muffa dei fruttiferi	Concentrazione: 0.06 % Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: durante la fioritura	7, 8
Viticoltura:			
Vite	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.2 kg/ha	9, 10
Orticoltura:			
Cetrioli	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 giorni	1
Cipolle	Marciume bianco della cipolla	Dosaggio: 1 kg/ha Applicazione: 1° trattamento allo stadio di due foglie, 2° trattamento tre settimane dopo (in caso di semina autunnale in primavera)	
Cipolle	Botrite della cipolla (Botrytis squamosa)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1
Fagioli	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 0.5–0.8 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1
Insalate (Asteracee)	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea), rizottonia	Dosaggio: 0.5–0.8 kg/ha Applicazione: trattamento al più tardi entro 14 giorni dalla piantagione	1

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Melanzana, pomodori	Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 giorni	1
Valerianella	Marciume grigio (Botrytis cinerea), rizottonia	Dosaggio: 0.6 kg/ha Termine d'attesa: 35 giorni Applicazione: trattamento al più tardi entro 14 giorni dalla piantagione	
Coltivazione piante ornam.:			
Bosso (Buxus)	Cylindrocladium buxicola	Concentrazione: 0.1 % Applicazione: da metà aprile fino ad ottobre	11, 12
In generale	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1–0.12 %	1
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Muffa delle nevi, muffa delle nevi	Dosaggio: 1.5 kg/ha	1

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 2 = La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini, 4 piante/m².
- 3 = Per i lamponi estivi e le more la dose per trattamento indicata si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m³/ha. Per i lamponi autunnali la dose per trattamento si riferisce allo stadio di inizio.
- 4 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 5 = 1–2 trattamenti.
- 6 = SPa 1: per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 7 = Anche per applicazione per via aerea.
- 8 = La dose citata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.
- 9 = Ultimo trattamento all'invaiaura, ma al più tardi a metà agosto.
- 10 = Al massimo 1 trattamento per anno.
- 11 = SPa 1: per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 4 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 12 = Trattamenti a intervalli di 4 settimane.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

3 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch