

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 9 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): quizalofop-P-etile 50 g/l
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Realchemie Quizalophop	Numero di omologazione svizzero: D-4521 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024060-00/021 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Quizalophop	Numero di omologazione svizzero: D-4522 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024060-00/015 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Quizalophop	Numero di omologazione svizzero: D-4523 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024060-00/016 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche:			
Fragola	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Applicazione: non applicare dalla fioritura al raccolto.	1
Fragola	Gramigno	Dosaggio: 1–2.5 l/ha Applicazione: non applicare dalla fioritura al raccolto.	1, 2
Lampone, Mora, Specie di ribes	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	1
Lampone, Mora, Specie di ribes	Gramigno	Dosaggio: 1–2.5 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	1, 2
Frutticoltura:			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	1
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Gramigno	Dosaggio: 1–2.5 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	1, 2
Orticoltura:			
Asparagi, Barba-bietola, Cavolo cappuccio (bianco, rosso, verza), Cavolo cinese, Cavolo rapa, Cipolle, Porro, Sedano	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1
Asparagi, Barba-bietola, Cavolo cappuccio (bianco, rosso, verza), Cavolo cinese, Cavolo rapa, Cipolle, Porro, Sedano	Gramigno	Dosaggio: 1–2.5 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1, 2
Broccoli, Carote, Cavolfiore	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1
Broccoli, Carote, Cavolfiore	Gramigno	Dosaggio: 1–2.5 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1, 2
Cicoria belga	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1
Fagiolo nano	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1
Campicoltura:			
Barbabietola da foraggio, Barba-bietola da zucchero, Colza, Fava, Patate, Piselli proteici	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero, Colza, Fava, Piselli proteici	Gramigno	Dosaggio: 1–2.5 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1, 2
Girasole	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha	1
Kenaf	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Applicazione: in postlevata.	1
Lino	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Applicazione: in postlevata.	1
Patate	Gramigno	Dosaggio: 1–2.5 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1, 3
Piselli per conserve	Gramigno	Dosaggio: 1–2.5 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1, 2
Piselli per conserve	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1
Soia	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.75–1.25 l/ha	1
Superfici di comp. ecol. secondo OPD:			
Superficie coltiva aperta	Gramigno	Concentrazione: 1 % Applicazione: con vaporizzatore a zaino.	4

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Non è efficace contro la Poa annua.
2 = È possibile effettuare un trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).
3 = Trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).
4 = Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch