

Décision de portée générale concernant l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans des cas particuliers

du 18 avril 2012

L'Office fédéral de l'agriculture,

vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires¹,
décide:

Le produit phytosanitaire

Karate with Zeon Technology (W 6098, 9,43 % Lambda-Cyhalothrin)

est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2012 pour une utilisation limitée,
liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Cultures des baies			
Fraise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 3, 4, 5
Framboise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6
Mûre	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 7
Espèces de Ribes	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8
Myrtillier	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8
Grand sureau	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9

¹ RS 916.161

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Minikiwi	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9

Charges pour l'utilisation

- 1 Ne traiter qu'en présence constatée de *Drosophila suzukii* dans la parcelle ou à proximité.
- 2 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 3 Le dosage indiqué se réfère au stade «pleine floraison» et «début de la coloration rouge des fruits», 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 4 2 traitements par parcelle et par année au maximum.
- 5 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies) ou dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient pas présents.
- 6 Pour les framboises d'été, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour les framboises d'automne, le dosage indiqué se réfère aux haies d'une hauteur comprise entre 150 et 170 cm; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 7 Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 8 Le dosage indiqué se réfère au stade «mise à fruits (50–90 % des inflorescences ont des fruits visibles)»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 9 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies).

Le produit phytosanitaire

Ravane 50 (W 6382, 4,81 % Lambda-Cyhalothrin)

est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2012 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Cultures des baies			
Fraise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,04 % Dosage: 0,4 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 3, 4, 5
Framboise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,04 % Dosage: 0,4 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6
Mûre	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,04 % Dosage: 0,4 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 7
Espèces de Ribes	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,04 % Dosage: 0,4 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Myrtillier	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,04 % Dosage: 0,4 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8
Grand sureau	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,04 % Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9
Minikiwi	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,04 % Délai d'attente: 7 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9

Charges pour l'utilisation

- 1 Ne traiter qu'en présence constatée de *Drosophila suzukii* dans la parcelle ou à proximité.
- 2 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 3 Le dosage indiqué se réfère au stade «pleine floraison» et «début de la coloration rouge des fruits», 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 4 2 traitements par parcelle et par année au maximum.
- 5 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies) ou dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient pas présents.
- 6 Pour les framboises d'été, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour les framboises d'automne, le dosage indiqué se réfère aux haies d'une hauteur comprise entre 150 et 170 cm; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 7 Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 8 Le dosage indiqué se réfère au stade «mise à fruits (50–90 % des inflorescences ont des fruits visibles)»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 9 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies).

Le produit phytosanitaire

Alanto (W 5933, 40,4 % Thiaclopid)

est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2012 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Cultures des baies			
Fraise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 3, 4
Framboise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Mûre	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 6
Espèces de Ribes	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 7
Myrtillier	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 7
Grand sureau	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9
Minikiwi	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9
Arboriculture			
Fruits à noyaux	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,025 % Dosage: 0,4 l/ha Délai d'attente: 14 jours Application: stade 83–87 (BBCH)	1, 2, 4, 8, 9

Charges pour l'utilisation

- 1 Ne traiter qu'en présence constatée de *Drosophila suzukii* dans la parcelle ou à proximité.
- 2 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 3 Le dosage indiqué se réfère au stade «pleine floraison» et «début de la coloration rouge des fruits», 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 4 2 traitements au maximum par parcelle et par année avec des produits du même groupe de matières actives.
- 5 Pour les framboises d'été, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour les framboises d'automne, le dosage indiqué se réfère aux haies d'une hauteur comprise entre 150 et 170 cm; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 6 Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 7 Le dosage indiqué se réfère au stade «mise à fruits (50–90 % des inflorescences ont des fruits visibles)»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 8 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.
- 9 SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de dérive conformément aux instructions de l'OFAG.

Le produit phytosanitaire

Audienz (W 6020, 480 g/l spinosad)

est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2012 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Cultures des baies			
Fraise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 3, 4, 5
Framboise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6, 7
Mûre	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6, 8
Espèces de Ribes	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6, 9
Myrtillier	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6, 9
Grand sureau	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 6, 10, 12
Minikiwi	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 6, 10, 12
Arboriculture			
Fruits à noyaux	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage: 0,32 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 83–87 (BBCH)	1, 2, 4, 6, 10, 11, 12
Viticulture			
Vigne	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,015 % Dosage: 0,18 l/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 83–89 (BBCH)	2, 6, 10, 13, 14, 15, 16

Charges pour l'utilisation

- 1 Ne traiter qu'en présence constatée de *Drosophila suzukii* dans la parcelle ou à proximité.
- 2 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie
- 3 Le dosage indiqué se réfère au stade «pleine floraison» et «début de la coloration rouge des fruits», 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha
- 4 2 traitements par parcelle et par année au maximum.

- 5 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies) ou dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient pas présents.
- 6 Le producteur doit s'assurer que la concentration limite en résidus ne soit pas dépassée au moment de la commercialisation.
- 7 Pour les framboises d'été, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour les framboises d'automne, le dosage indiqué se réfère aux haies d'une hauteur comprise entre 150 et 170 cm; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 8 Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 9 Le dosage indiqué se réfère au stade «mise à fruits (50–90 % des inflorescences ont des fruits visibles)»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 10 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies).
- 11 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.
- 12 SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de dérive conformément aux instructions de l'OFAG.
- 13 Ne traiter qu'en cas de présence constatée de larves dans les grains après le stade BBCH 83.
- 14 4 traitements par parcelle et par année au maximum.
- 15 Le dosage mentionné s'applique à la zone des grappes et se réfère à une quantité de bouillie de référence de 1200 l/ha.
- 16 Spa 1 Pour éviter le développement de résistances alterner les traitements avec des produits d'autres groupes de matières actives.

Le produit phytosanitaire

Parexan N (W 5959, 49.4 g/l pyréthrin, 198 g/l huile de sésame raffinée)

est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2012 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Cultures des baies			
Fraise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,15 % Dosage: 1.5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 3, 4, 5
Framboise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,15 % Dosage: 1.5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6
Mûre	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,15 % Dosage: 1.5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 7
Espèces de Ribes	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,15 % Dosage: 1.5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Myrtillier	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,15 % Dosage: 1,5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8
Grand sureau	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,15 % Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9
Minikiwi	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,15 % Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9
Arboriculture			
Fruits à noyaux	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,1 % Dosage: 1,6 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 83–87 (BBCH)	1, 2, 4, 9, 10
Viticulture			
Vigne	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,1 % Dosage: 1,6 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 83–89 (BBCH)	2, 9, 11, 12, 13, 14

Charges pour l'utilisation

- 1 Ne traiter qu'en présence constatée de *Drosophila suzukii* dans la parcelle ou à proximité. Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 3 Le dosage indiqué se réfère au stade «pleine floraison» et «début de la coloration rouge des fruits», 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 4 3 traitements par parcelle et par année au maximum.
- 5 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies) ou dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient pas présents.
- 6 Pour les framboises d'été, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour les framboises d'automne, le dosage indiqué se réfère aux haies d'une hauteur comprise entre 150 et 170 cm; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 7 Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 8 Le dosage indiqué se réfère au stade «mise à fruits (50–90 % des inflorescences ont des fruits visibles)»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 9 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies).
- 10 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.
- 11 Ne traiter qu'en cas de présence constatée de larves dans les grains après le stade BBCH 83.
- 12 Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4500 m³ par ha.
- 13 4 traitements par parcelle et par année au maximum.
- 14 Spa 1 Pour éviter le développement de résistances alterner les traitements avec des produits d'autres groupes de matières actives.

Le produit phytosanitaire

Pyrethrum FS (W 5777, 72.6 g/l pyréthrinés, 326 g/l huile de sésame raffinée)

est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2012 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Cultures des baies			
Fraise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,05 % Dosage: 0,5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 3, 4, 5
Framboise	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,05 % Dosage: 0,5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6
Mûre	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,05 % Dosage: 0,5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 7
Espèces de Ribes	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,05 % Dosage: 0,5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8
Myrtillier	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,05 % Dosage: 0,5 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8
Grand sureau	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,05 % Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9
Minikiwi	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,05 % Délai d'attente: 3 jours Application: stade 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9
Arboriculture			
Fruits à noyau	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,05 % Dosage: 0,8 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 83–87 (BBCH)	1, 2, 4, 9, 10
Viticulture			
Vigne	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,075 % Dosage: 1,2 l/ha Délai d'attente: 3 jours Application: stade 83–89 (BBCH)	2, 9, 11, 12, 13, 14

Charges pour l'utilisation

- 1 Ne traiter qu'en présence constatée de *Drosophila suzukii* dans la parcelle ou à proximité.
- 2 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 3 Le dosage indiqué se réfère au stade «pleine floraison» et «début de la coloration rouge des fruits», 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 4 3 traitements par parcelle et par année au maximum.

- 5 SPE 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies) ou dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient pas présents.
- 6 Pour les framboises d'été, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour les framboises d'automne, le dosage indiqué se réfère aux haies d'une hauteur comprise entre 150 et 170 cm; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 7 Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 8 Le dosage indiqué se réfère au stade «mise à fruits (50–90 % des inflorescences ont des fruits visibles)»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
- 9 SPE 8 – Dangereux pour les abeilles: Pulvérisation uniquement en dehors de la période de vol des abeilles (le soir) sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies).
- 10 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.
- 11 Ne traiter qu'en cas de présence constatée de larves dans les grains après le stade BBCH 83.
- 12 Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4500 m³ par ha.
- 13 4 traitements par parcelle et par année au maximum.
- 14 Spa 1 Pour éviter le développement de résistances alterner les traitements avec des produits d'autres groupes de matières actives.

Le produit phytosanitaire

Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid)

est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2012 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Arboriculture			
Fruits à noyaux	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,02 % Dosage 0,32 kg/ha Délai d'attente: 14 jours Application: stade 83–87 (BBCH)	1, 2, 3, 4

Charges pour l'utilisation

- 1 Ne traiter qu'en présence constatée de *Drosophila suzukii* dans la parcelle ou à proximité.
- 2 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 3 2 traitements par parcelle et par année au maximum avec des produits du même groupe de matières actives.
- 4 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.

Les produits phytosanitaires suivants sont autorisés temporairement jusqu'au 31 octobre 2012 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Bellator Rex W-4499-1
Bi 58 D-4052
Bi 58 Insektenvernichter D-3836
Danadim Progress W-6701
Danadim Progress D-3837
Dimethoat Burri W-1425
Dimethoat Realchemie W-6534
Dimethoat S W-4499
Diméthoate W-4510
Perfekthion W-2329
Perfekthion W-5183
Rogor 40 W-1866
Rogor 40 W-1212
Roxion W-1309
Techn'oate F-3850

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Arboriculture			
cerisier	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentration: 0,04 % Dosage: 0,64 l/ha Délai d'attente: 3 semaines Application: stade 83–85 (BBCH)	1, 2, 3, 4, 5, 6

Charges pour l'utilisation

- 1 Ne traiter qu'en présence constatée de *Drosophila suzukii* dans la parcelle ou à proximité.
- 2 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 3 1 traitement au maximum par parcelle et par année.
- 4 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.
- 5 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles: Ne doit pas entrer en contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies). Les plantes d'enherbement et les adventices en fleurs doivent être éliminés avant le traitement (faucher ou mulcher la veille).
- 6 Le producteur de cerises participe aux contrôles spécifiques mis en place en vue de s'assurer que la concentration limite en résidus de 0,2 mg/kg ne soit pas dépassée au moment de la commercialisation.

Retrait de l'effet suspensif

Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative².

Voies de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

18 avril 2012

Office fédéral de l'agriculture:

Le directeur, Bernard Lehmann

² RS 172.021