Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation

du 19 octobre 2010

L'Office fédéral de l'agriculture,

vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires¹, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies,

décide:

Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:

1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés)

Substance(s) active(s): penconazole 100 g/l

Formulation: EC concentré émulsifiable

2. Produits commerciaux

Topas 10 EC	Numéro d'homologation suisse: D-4677 Pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: PI-023590-00/072 titulaire de l'autorisation étranger: Star Agro Analyse und Handels GmbH
AGRO AS 10 EC	Numéro d'homologation suisse: D-4733 Pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: PI-023590-00/042 titulaire de l'autorisation étranger: Agro Trade GMBH
AGRO AS 10 EC	Numéro d'homologation suisse: D-4734 Pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: PI-023590-00/079 titulaire de l'autorisation étranger: Agro Trade GMBH

¹ RS 916.161

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible/effets	Application	(*)
Culture des baies:			
cassis, groseilles à grappes, groseilles à maquereau, josta	oïdium des Ribes	Concentration: 0.025 % Dosage: 0.25 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	1, 2
fraise	oïdium du fraisier	Concentration: 0.025 % Dosage: 0.25 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	1, 3
Arboriculture:			
fruits à pépins	oïdium du cognassier, oïdium du pommier/du poirier	Concentration: 0.012 % Dosage: 0.2 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s) Application: jusqu'à fin juillet au plus tard., dès le débourrement.	4, 5
Viticulture			
toutes les cultures	oïdium de la vigne	Concentration: 0.025 % Dosage: 0.4 l/ha Application: jusqu'à mi-août au plus tard.	6, 7, 8
toutes les cultures	excoriose de la vigne, Pourriture noire (black rot) de la vigne, rougeot parasitaire de la vigne	Concentration: 0.05 % Dosage: 0.8 l/ha Application: jusqu'à mi-août au plus tard.	7, 8, 9
Culture maraîchère:			
cucurbitacées	oïdium des cucurbitacées	Concentration: 0.025 % Dosage: 0.25–0.4 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	1
cultures couvertes: cucurbitacées	oïdium des cucurbitacées	Concentration: 0.025 % Dosage: 0.25–0.4 l/ha Délai d'attente: 3 Jours	1
cultures couvertes: tomate	oïdium de la tomate	Concentration: 0.025 % Dosage: 0.25–0.4 l/ha Délai d'attente: 3 Jours	1
tomate	oïdium de la tomate	Concentration: 0.025 % Dosage: 0.25–0.4 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	1
Grande culture:			
houblon	oïdium du houblon	Concentration: 0.05 %	1
Plein air: tabac	Oïdium du tabac	Dosage: 0.375 l/ha Délai d'attente: 7 Jours Application: Dès qu'il y a risque de contamination.	7
Culture ornementale:			
toutes les cultures	Oïdiums des plantes ornementales	Concentration: 0.025–0.05 %	1

(*) Charges et remarques

- 1 = 4 traitements au maximum par année.
 - 2 = Le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
 - 3 = Le dosage indiqué se réfère au stade «pleine floraison» et «début de la coloration rouge des fruits», 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
 - 4 = Le dosage indiqué doit s'appliquer à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.
 - 5 = SPa 1: Pour éviter le développement de résistances 4 traitements au maximum par parcelle et par année avec des produits du même groupe de matières actives.
 - 6 = Convient également au traitement par voie aérienne.
 - 7 = SPa 1: Pour éviter le développement de résistances 3 traitements au maximum par parcelle et par année avec des produits du même groupe de matières actives.
 - 8 = Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4500 m³ par ha.
 - 9 = Uniquement en mélange avec 0.1 % de Folpet DG.
-

Stockage et élimination

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle

La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Voies de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Celui-ci doit être adressé au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

19 octobre 2010

Office fédéral de l'agriculture:

Le directeur, Manfred Bötsch