

# Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation

du 4 décembre 2007

*L'Office fédéral de l'agriculture,*

vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires<sup>1</sup>, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies,

*décide:*

## **Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:**

### *1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés)*

Substance(s) active(s): iprodione 50 %

Formulation: WP poudre mouillable

### *2. Produits commerciaux*

Attrade-Iprodion 50 % Numéro d'homologation suisse: A-4047

WP Pays d'origine: Autriche

numéro d'homologation étranger: 2055-4

titulaire de l'autorisation étranger: Agrotech Trading

## **Applications autorisées:**

| Domaine d'application          | Organisme nuisible/effets              | Application                                                              | (*)           |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Culture des baies</b>       |                                        |                                                                          |               |
| fraise                         | pourriture grise<br>(Botrytis cinerea) | Concentration: 0.1 %<br>Dosage: 1 kg/ha<br>Délai d'attente: 2 semaines   | 1, 2, 3,<br>4 |
| framboise, ronces              | pourriture grise<br>(Botrytis cinerea) | Concentration: 0.1 %<br>Dosage: 1 kg/ha<br>Délai d'attente: 2 semaines   | 1, 2, 3,<br>5 |
| <b>Arboriculture</b>           |                                        |                                                                          |               |
| cerisier, prunier<br>(pruneau) | monilioses                             | Concentration: 0.1 %<br>Dosage: 1.6 kg/ha<br>Délai d'attente: 3 semaines | 6, 7          |

<sup>1</sup> RS 916.161

| Domaine d'application                                            | Organisme nuisible/effets                                                                                            | Application                                                                                                                          | (*)  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| toutes les cultures                                              | moniliose des fleurs                                                                                                 | Concentration: 0.1 %<br>Dosage: 1.6 kg/ha<br>Application: pendant la floraison.                                                      | 6, 7 |
| <b>Culture maraîchère</b>                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |      |
| asperge                                                          | brûlure des feuilles de l'asperge                                                                                    | Concentration: 0.1 %<br>Dosage: 0.6–1.6 kg/ha                                                                                        | 1, 7 |
| carotte                                                          | alternariose de la carotte                                                                                           | Concentration: 0.1–0.15 %<br>Dosage: 0.6–1.6 kg/ha<br>Délai d'attente: 3 semaines                                                    |      |
| chicorée scarole, chicorée frisée, laitue pommée, laitue romaine | pourriture du collet et de la tige ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), pourriture grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ) | Concentration: 0.1 %<br>Dosage: 1 kg/ha<br>Application: dès le stade 4–6 feuilles jusqu'à 14 jours au plus tard après la plantation. | 1, 2 |
| chicorée witloof (chicorée-endive)                               | alternarioses                                                                                                        | Concentration: 0.1–0.15 %<br>Dosage: 0.6–1.6 kg/ha<br>Délai d'attente: 2 semaines                                                    | 1    |
| chicorée witloof (chicorée-endive)                               | pourriture du collet et de la tige ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), pourriture grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ) | Concentration: 0.1 %<br>Application: traitement des racines.                                                                         | 1    |
| choux                                                            | maladie des taches noires du chou, pourriture grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                      | Concentration: 0.1–0.15 %<br>Dosage: 0.6–1.6 kg/ha<br>Délai d'attente: 3 semaines                                                    | 1, 7 |
| choux, liliacées, ombellifères (Apiaceae)                        | alternarioses, <i>Botrytis</i> spp.                                                                                  | Application: désinfection à sec des semences de légumes.                                                                             |      |
| cultures couvertes: concombre, tomate                            | alternariose, pourriture grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                           | Concentration: 0.1 %<br>Délai d'attente: 3 jours<br>Application: dès le début de la floraison.                                       | 1, 7 |
| oignon                                                           | <i>Botrytis</i> spp.                                                                                                 | Concentration: 0.15 %<br>Dosage: 1.5 kg/ha                                                                                           | 7    |
| <b>Grande culture</b>                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |      |
| plant de pomme de terre                                          | rhizoctone de la pomme de terre                                                                                      | Concentration: 0.8 %<br>Dosage: 8 g/l d'eau<br>Application: traitement des semences, tremper pendant 3 minutes.                      | 8    |
| <b>Culture ornementale</b>                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |      |
| bulbes des fleurs, tubercules de fleurs                          | champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) [désinfection et/ou traitement du sol]                      | Concentration: 0.1 %                                                                                                                 |      |

| Domaine d'application                 | Organisme nuisible/effets                                                              | Application                                                                                                  | (*) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| gazon d'ornement et terrains de sport | moisissure des neiges (du sol et transmise par les semences),<br>pourriture des neiges | Dosage: 60 g/100 m <sup>2</sup><br>Application: arrosage en mélange avec 20 g/100 m <sup>2</sup><br>Benlate. |     |
| toutes les cultures                   | alternarioses, Botrytis spp.                                                           | Concentration: 0.1 %                                                                                         | 7   |

#### (\*) Charges et remarques

- 1 = Il est possible d'observer une diminution de l'efficacité sur des souches résistantes.
- 2 = 1 traitement par parcelle et par année au maximum.
- 3 = La concentration indiquée se réfère à un volume d'eau de base de 1000 l par ha.
- 4 = Le dosage indiqué se réfère aux stades pleine floraison et le début de la coloration rouge des fruits, 4 plants par m<sup>2</sup>.
- 5 = Pour les framboises d'été et les mûres, le dosage indiqué se réfère aux stades du début de la floraison et de la pleine floraison, volume de haie 10 000 m<sup>3</sup> par ha. Pour les framboises d'automne, le dosage indiqué se réfère aux stades des boutons floraux p
- 6 = Le dosage doit s'appliquer à un volume d'arbre de 10'000 m<sup>3</sup> par ha.
- 7 = 2 traitements par parcelle et par année au maximum.
- 8 = L'étiquette de l'emballage doit porter la mention suivante: La désinfection des plants de pommes de terre avec du Rovral peut entraîner une diminution de la taille des tubercules à la récolte, sans que cela n'influe sur le rendement total.

### Stockage et élimination

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

### Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle

La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

### Voies de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Celui-ci doit être adressé au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

4 décembre 2007

Office fédéral de l'agriculture:

Le directeur, Manfred Bötsch